

デュタステリド錠0.5mgZA「FCI」を 服用される方へ

安全にご使用いただくために、必ずお読みください。

保管上の注意

保管の際には、高温、多湿を避けて保管してください。
また、服用する直前にPTPシートから取り出し、服用してください。

医師または薬剤師の連絡先

デュタステリド錠0.5mgZA「FCI」の効能・効果

男性における男性型脱毛症

デュタステリド錠0.5mgZA「FCI」のはたらき

男性型脱毛症（Androgenic alopecia:AGA）は、男性の薄毛の主な原因と考えられています。デュタステリドは男性ホルモンの1つであるテストステロンをジヒドロテストステロン（DHT）に変換する5 α 還元酵素（1型及び2型）の作用を阻害することにより、DHTの量を減らし、髪の毛の数が増える、太くなるなどの効果を示します。

服用方法

通常、成人男性は1日1回、1錠を服用します。



富士化学工業株式会社
Fuji Chemical Industries Co., Ltd.

服用にあたっての注意

- 男性における男性型脱毛症以外の脱毛症に対する治療を目的として服用することはできません。
- 成人男性の方のみ、この薬を服用できます。
- 1日1回、1錠を毎日忘れずに服用してください。
ご自身の判断で、量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。飲み忘れた場合は、気がついた時にその日の分を服用してください。2回分を1度に飲まないでください。
誤って多く飲んだ場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。
- 女性や子どもはこの薬を服用しないでください。また、この薬の有効成分は皮膚から吸収されるため、粉砕・破損した薬剤に触れないようにしてください。粉砕・破損した薬剤に触れた場合は、すぐに石けんと水で洗い流してください。
- 妊娠している女性が服用した場合、男子胎児の生殖器官等の発達に影響を及ぼすおそれがあります。
- デュタステリド錠 0.5mgZA「FCI」はコーティングされているため、通常の取り扱いで有効成分に触れることはありません。
- この薬は、前立腺癌の検査で測定される血清前立腺特異抗原（PSA）値を低下させます。PSA 検査を行う際は、この薬を服用中であることを必ず担当の医師にお伝えください。
- この薬を服用中、または最後に服用してから6か月間は献血をしないでください。
- この薬の服用後、3か月で効果があらわれる人もいますが、通常は6か月間服用を続けることが必要です。ご自身の判断で薬の服用を中止せず、医師の指示通りに服用を継続してください。

副作用について

次のような副作用があらわれるおそれがあります。気になる症状があらわれた場合は、すぐに医師又は薬剤師にご相談ください。

特に注意が必要な副作用

- ▶ 肝機能障害、黄疸（吐き気、食欲不振、体がだるい、皮膚や白目が黄色くなる、尿の色が濃くなる、など）

その他の主な副作用

- ▶ 勃起不全、性欲減退、射精障害（これらの副作用は、服用を中止した後も持続する場合があります。）
- ▶ 乳房障害（乳房の腫れや痛み）

- 男性の生殖能力への影響は明らかではありませんが、精子の数や精液量が減少したり、精子の運動が弱まるおそれがあります。
- この薬との関連性は明らかではありませんが、前立腺肥大症を対象とした海外臨床試験において、乳癌が報告されています。
- 前立腺癌のリスクが高い男性を対象とした臨床試験において、デュタステリドを服用した男性は、デュタステリドを服用しなかった男性と比べて、悪性度の高い前立腺癌の発現頻度が高かったという報告があります。