

フィナステリド錠「FCI」を 服用される患者さんご家族の方へ

安全にご使用いただくために、必ずお読みください。

成人男性の方のみ、このお薬を服用できます。

- 女性には効果が認められていません。
- 妊婦・妊娠の可能性のある方・授乳中の方は服用しないでください。
妊娠中の方が服用すると、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼす恐れがあります。
- 未成年者に対する効果・安全性は確立していません。

錠剤を割って飲まないでください。

- 錠剤を割って服用した場合の安全性・有効性は保証されていません。
- 妊娠中の方が破損した錠剤に触れて、有効成分が体内に吸収されると、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼす恐れがあります。
- フィナステリド錠「FCI」はコーティングされているので、通常の取り扱いで有効成分に触れることはありません。

効果が確認できるまで、通常6ヵ月服用を続けることが大切です。
ご自身の判断で、飲む量を変えないでください。

医師または薬剤師の連絡先



富士化学工業株式会社
Fuji Chemical Industries Co., Ltd.

**このお薬は基本的に薄毛の進行を止めるものです。
6ヵ月服用しても抜け毛が減らない場合は、医師にご相談ください。**

このお薬の正しい使い方

1日1回決められた量を服用してください。

- ご自身の判断で、量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときにその日の分を飲んでください。
2回分を一度に飲まないでください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師にご相談ください。

肝機能障害がある方は医師に相談してください。

ご家族や他の人にあげないでください。

誤って飲まないよう、小児の手の届かないところに保管してください。

このお薬を服用中、および服用後1ヵ月間は献血をしないようにしてください。



服用前に必ず医師・薬剤師に相談が必要な方

- これまでに、他のお薬を服用して発疹などが出たことのある方
- 肝機能障害のある方
- 前立腺がん健診（PSA 検査）を受ける予定がある方
- 他の病気でお薬を服用している方、新しく服用し始める予定のある方（薬局で買った市販薬も含む）
- 男性型脱毛症に対して、市販の育毛ローションなど、他の対処法を行っている方

副作用について

次のような副作用があらわれる可能性があります。
気になる症状があらわれた場合は、すぐに医師・薬剤師にご相談ください。

食欲不振、全身倦怠感、性欲減退、勃起機能不全