

# シルデナフィル錠VI「FCI」の 正しい使い方について



この冊子にはシルデナフィル錠VI「FCI」に関する大切な注意事項  
が書いてあります。服用前に必ずお読みください。



富士化学工業株式会社  
Fuji Chemical Industries Co., Ltd.

シルデナフィル錠VI「FCI」は、満足な性行為を行なうに十分な勃起とその維持ができない患者さんのための勃起不全治療薬です。

シルデナフィル錠VI「FCI」は、勃起不全の治療薬ですが、**飲み方を誤ると重大な副作用があらわれ、命にかかわることがあります。**外国および国内において、同じ成分(シルデナフィルクエン酸塩)を含む薬剤が原因であることを否定できない死亡例も報告されています。

この冊子には、シルデナフィル錠VI「FCI」を適正にご使用いただく上で大切な情報が記載されておりますので、服用される前に必ずお読みください。さらに、ご不明なことがある場合は、医師または薬剤師までおたずねください。

## シルデナフィル錠VI「FCI」の飲み方

- ◆シルデナフィル錠VI「FCI」は性行為の約1時間前に服用してください。食事をした後に飲むと、効果が出るまでに時間がかかります。
- ◆**1日1回まで、24時間以上あけて服用してください。**
- ◆シルデナフィル錠VI「FCI」には25mg、50mgの2種類の錠剤があり、**1回に服用できる量は医師に指示された25mgまたは50mgまでです。**
- ◆**決して指示された量以上を服用してはいけません。効果の増大が見込めないばかりか、副作用の出現リスクを増大することになります。**



## 心臓の病気で硝酸薬や抗不整脈薬を使用の方は服用しないでください

- ◆心臓病の薬として用いられている硝酸薬\*、抗不整脈薬(塩酸アミオダロン)を使用の方は、決してシルデナフィル錠VI「FCI」を服用しないでください。急激に血圧が下がり、死に至ることがあります。

硝酸薬には飲み薬以外にも、舌下錠、貼り薬、注射、吸入剤、スプレーなどがあります。ご自身のお薬をもう一度ご確認ください。

- ◆他にも服用中のお薬がある方は、必ずそのことを医師または薬剤師にお話し、あなたが服用しているお薬に硝酸薬や抗不整脈薬が含まれていないか、確認してください。
- ◆性行為は心臓に負担をかけます。心臓に持病のある方\*や脳血管に病気のある方\*は、シルデナフィル錠VI「FCI」を飲む前に、必ず医師にご相談ください。

\*狭心症、重度の心血管系障害、心不全、脳出血、脳梗塞など

\*詳しいお薬の名前は、  
6ページをご覧ください。



富士化学工業株式会社  
Fuji Chemical Industries Co., Ltd.

## シルデナフィル錠VI「FCI」を服用できない方

- ◆今までにシルデナフィル錠VI「FCI」および同じ成分(シルデナフィルクエン酸塩)を含むお薬を服用してアレルギー(過敏症)を起こしたことがある方
- ◆心血管系障害などにより医師から性行為が不相当だと診断された方
- ◆抗不整脈薬を使用中の方
- ◆重度の肝障害のある方
- ◆低血圧の方や高血圧の方  
低血圧:最大血圧が90mmHg未満  
高血圧:最大血圧が170mmHg以上または最小血圧が100mmHg以上
- ◆脳血管に病気のある方(脳出血・脳梗塞)や心筋梗塞を起こした方
- ◆網膜色素変性症(進行性の夜盲)と診断された方

### 服用前に医師にご相談が必要な方

腎臓の病気、肝臓の病気、赤血球の異常(鎌状赤血球性貧血)、白血病、多発性骨髄腫、血が止まりにくい病気、薬物アレルギー、胃・十二指腸潰瘍、遺伝性の目の病気、ペニスに関する病気または奇形のある方、他の勃起不全治療薬・勃起補助器具を使用している方や手術を受けた方



## シルデナフィル錠VI「FCI」の服用後に 狭心症の発作が起きたときには

- ◆狭心症の発作が起きた場合は、その場で安静にし、直ちにかかりつけの医師に連絡してください。
- ◆今まで狭心症と診断されたことがない方でも、性行為中に狭心症の発作を起こすことがあります。
- ◆狭心症発作の治療には硝酸薬がよく使用されますが、シルデナフィル錠VI「FCI」を服用中の場合は血圧を下げる効果が強く出ることがあります。その場合、発作治療のための硝酸薬が使用できず、他の薬剤を使用しなければならないため、硝酸薬と同じ効果が得られないことがあります。
- ◆発作治療の際には、シルデナフィル錠VI「FCI」を服用したことで服用した時間を医師にお伝えください。
- ◆発作発生時には、ご自身がそのことを医師に伝えられない可能性もあります。

そのため、あらかじめパートナーやご家族の方にシルデナフィル錠VI「FCI」を服用していることを伝え、本剤を服用していることが医師に伝わるようにしてください。



富士化学工業株式会社  
Fuji Chemical Industries Co., Ltd.

## 副作用症状がでたら服用を中止して医師にご相談ください

「気分が悪くなる」「頭痛」「めまい」「顔が赤くなる(ほてり)」「消化不良」「光に過敏になる」「色が変化して見える」などの副作用が現れることがあります。**自動車や機械の運転操作をする場合にはご注意ください。**

**なお、勃起の持続によってペニスが損傷し勃起機能を永続的に失うことがありますので、シルデナフィル錠VI「FCI」を服用後4時間以上勃起が続く場合は、すぐに医師に連絡してください。**

## その他のご注意

- ◆シルデナフィル錠VI「FCI」はあなたのために処方されたお薬です。他の人には絶対に譲らないでください。この薬は、人によっては薬の相互作用の問題で服用が出来ない場合があるお薬です。
- ◆他の薬との相互作用がでる場合がありますので、他の医療機関を受診するときは、シルデナフィル錠VI「FCI」を服用していることを申し出てください。
- ◆シルデナフィル錠VI「FCI」には、エイズなどの性行為感染症を防ぐ効果はありません。
- ◆視覚や聴覚に異常を感じた方は、服用を中止して医師にご相談ください。
- ◆シルデナフィル錠VI「FCI」は催淫剤や性欲増進剤ではありません。



## 主な併用禁忌薬

### 塩酸アミオダロン製剤

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| アンカロン錠100/注150                    | アミオダロン塩酸塩錠100mg [トーフ] |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg [TE], 100mg [TE] | アミオダロン塩酸塩錠100mg [サウド] |
| アミオダロン塩酸塩錠100mg [サワイ]             |                       |

### 主なニトログリセリンなどの硝酸剤

|  |  |
|--|--|
| アイトロール錠10mg, 20mg  | ニトロールRカプセル20mg   |
| アイクロール錠10, 20  | ニトロール錠5mg  |
| 亜硝酸アミル [第一三共]  | ニトロールスプレー1.25mg  |
| アンタップテープ40mg   | ニトロール持続静注25mgシリンジ  |
| イソコナールRカプセル20mg  | ニトロール注5mg / 5mgシリンジ  |
| イソニトール錠10mg, 20mg  | ニトロール点滴静注50mgバッグ, 100mgバッグ   |
| イソビットテープ40mg   | ニトログリセリン舌下錠0.3mg [NK]  |
| 一硝酸イソソルビド錠10mg [サワイ], 20mg [サワイ]   | ニトログリセリン注1mg/2mL [HK]  |
| 一硝酸イソソルビド錠10mg [タイヨー], 20mg [タイヨー]                                       | ニトログリセリン注5mg/10mL [HK]   |
| 一硝酸イソソルビド錠10mg [トーフ], 20mg [トーフ]   | ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ [テルモ]   |
| L-オーネスゲン錠20mg  | ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ [TE]   |
| カリアントSRカプセル20mg  | ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL [HK]   |
| 冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL   | ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL [HK]  |
| サーフレス注0.05% (10mL), 0.05% (100mL), 0.1% (5mL), 0.1% (50mL), 0.1% (100mL) | ニトロダームTTS25mg  |
| ジアセラL錠20mg   | ニトペン舌下錠0.3mg   |
| シグマート錠2.5mg, 5mg   | ニブラジロールPF点眼液0.25% [日点] *   |
| シグマート注2mg, 12mg, 48mg  | ニブラジロール点眼液0.25% [TOA] *  |
| シドレンテープ27mg  | ニブラジロール点眼液0.25% [サワイ] *  |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg [EMEC]   | ニブラジロール点眼液0.25% [わかもと] *   |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg [サワイ]  | ニブラノール点眼液0.25% *   |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg [テイコク]   | ハイパジールコーワ錠3, 6   |
| 硝酸イソソルビド徐放錠20mg [サワイ]  | ハイパジールコーワ点眼液0.25% *  |
| 硝酸イソソルビド徐放錠20mg [ソルハラ]   | バソレーターテープ27mg  |
| シルビノール錠5mg   | バソレーター注1mg, 5mg, 25mg, 50mg  |
| ソプレロール錠10mg, 20mg  | フランドル錠20mg   |
| タイシロール錠10mg, 20mg  | フランドルテープ40mg   |
| ニコランジル錠2.5mg [サワイ], 5mg [サワイ]  | ミオコールスプレー0.3mg   |
| ニコランジル錠2.5mg [日医工], 5mg [日医工]  | ミニロテープ27mg   |
| ニコランジル点滴静注用2mg [サワイ], 12mg [サワイ], 48mg [サワイ]                             | ミリステープ5mg  |
| ニコランジル点滴静注用2mg [日医工], 12mg [日医工], 48mg [日医工]                             | ミオコール静注1mg, 5mg / 点滴静注25mg, 50mg                                     |
| ニコランジル点滴静注用2mg [F], 12mg [F], 48mg [F]                                   | ミリスロール注1mg/2mL, ミリスロール注5mg/10mL, ミリスロール注25mg/50mL, ミリスロール注50mg/100mL |
| ニコランマー錠2.5mg, 5mg  | メデイトランテープ27mg  |
| ニトプロ持続静注液6mg, 30mg   | リファタックテープ40mg  |
| ニトラステープ40mg  |  |

\*印…併用禁忌ではございませんが、念のため記載いたしました。詳しくは各製品の添付文書をご確認ください。

### 可溶性グアニル酸シクラーゼ (sGC) 刺激剤

|                           |  |
|---------------------------|--|
| アダムパス錠0.5mg, 1.0mg, 2.5mg |  |
|---------------------------|--|

### その他の注意を要する医薬品

次の医薬品の添付文書併用禁忌欄に、シルデナフィルクエン酸塩錠が記載されています。

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| イトラコナゾール錠50 [MEEK], 100 [MEEK], 200 [MEEK] | カレトラ配合錠 / 配合内用液                      |
| イトラコナゾール錠50mg [科研]                         | クリキシバンカプセル200mg                      |
| イトラコナゾール錠50mg [日医工], 100mg [日医工]           | スタリビルド配合錠                            |
| イトラコナゾールカプセル50mg [SW]                      | テラビック錠250mg                          |
| イトラートカプセル50                                | ノーピア錠100mg / 内容液8%                   |
| イトリゾールカプセル50 / 内容液1%                       | アリジスタ錠300mg, 600mg / アリジスタナイーブ錠800mg |
| イトリゾール注1%[200mg]                           | ヴィキラックス配合錠                           |

平成28年3月医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品に関する情報」より改変



**富士化学工業株式会社**  
Fuji Chemical Industries Co., Ltd.

医療機関名

---

担当医氏名

---

電話番号

---



**富士化学工業株式会社**  
Fuji Chemical Industries Co., Ltd.  
富山県中新川郡上市町郷柿沢1番地

作成:2016年3月