

Tadalafil Tablets CI「FCI」

タダラフィル錠CI「FCI」を 服用される方へ

正しい使い方について

この冊子にはタダラフィル錠CI「FCI」に関する大切な注意事項が書いてあります。

タダラフィル錠CI「FCI」を正しく安全に使用していただくために、服用前に必ず最後までお読みください。



富士化学工業株式会社
Fuji Chemical Industries Co., Ltd.

タダラフィル錠CI「FCI」は、満足な性行為を行なうに十分な勃起とその維持ができない患者さんのための勃起不全治療薬です。

タダラフィル錠 CI「FCI」は、勃起不全の治療薬ですが、飲み方を誤ると重大な副作用があらわれ、命にかかわることがあります。

この冊子には、タダラフィル錠 CI「FCI」を適正にご使用いただく上で大切な情報が記載されておりますので、服用される前に必ずお読みください。さらに、ご不明なことがある場合は、医師または薬剤師までおたずねください。

タダラフィル錠CI「FCI」の飲み方

※必ず医師の指示を守って服用下さい。

- ◆ タダラフィル錠 CI「FCI」は 1 日 1 回とし、次の服用は必ず 2 4 時間以上あけてください。
※腎障害のある方は、次の服用を48時間以上あけるなどの注意が必要です。
- ◆ タダラフィル錠 CI「FCI」には、10mg、20mg の 2 種類の錠剤があり、1 回に服用できる量は医師に指示された **10mg または 20mg** までです。
※腎障害のある方は、医師の指示に従い 5mg (10mg 錠半錠) 又は 10mg を服用してください。
- ◆ 医師の指示なしに、服用量を増やさないでください。
- ◆ 薬の効果には個人差があります。指示された量で効果が得られない場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

心臓の病気で硝酸薬や抗不整脈薬を使用中の方は服用しないでください。

- ◆ 心臓病の薬として用いられている硝酸剤*を使用している方は、決してタダラフィル錠 CI「FCI」を使用しないでください。急激に血圧が下降し、重い副作用を起こすことがあります。

硝酸剤には飲み薬以外にも、舌下錠、貼り薬、注射、吸入剤、スプレーなどがあります。ご自身のお薬をもう一度ご確認ください。

- ◆ 他にも服用中の薬のある方は、必ずそのことを医師や薬剤師にお話し、あなたが服用しているお薬に硝酸剤が含まれていないか確認してください。
- ◆ 性行為は心臓に負担をかけます。心臓に持病のある方*や脳血管に病気のある方*は、タダラフィル錠 CI「FCI」を飲む前に、必ず医師にご相談ください。

*狭心症、重度の血管系障害、心不全、脳梗塞など

※詳しいお薬の名前は 6 ページをご覧ください。

次にあてはまる方は、タダラフィル錠 CI「FCI」を服用しないでください。

- ◆ 硝酸剤を服用中の方
- ◆ 今までにタダラフィル錠 CI「FCI」および同じ成分（タダラフィル）を含むお薬を服用してアレルギー（過敏症）を起こしたことがある方
- ◆ 肺高血圧症の治療に用いられる sGC 刺激剤（リオシグアト）を使用中の方
- ◆ 心血管系障害などにより医師から性行為が不適当だと診断された方
- ◆ 不安定狭心症のある方、または性交中に狭心症を起こしたことがある方
- ◆ 最近 3 か月以内に心筋梗塞を起こしたことがある方
- ◆ 最近 6 か月以内に脳梗塞・脳出血を起こしたことがある方
- ◆ コントロール不良の不整脈のある方
- ◆ 低血圧の方（最大血圧が 90mmHg 未満または最小血圧が 50mmHg 未満の方）

- ◆ コントロール不良の高血圧の方（最大血圧が 170mmHg 以上または最小血圧が 100mmHg 以上の方）
- ◆ 重い肝障害のある方
- ◆ 網膜色素変性症（進行性の夜盲、視野狭窄）の方

次にあてはまる方はタダラフィル錠CI「FCI」の服用に関して注意が必要です。必ず医師に相談してください。

- ◆ 肝臓の悪い方
- ◆ 腎臓の悪い方
- ◆ 陰茎の病気（屈曲、しこりなど）のある方
- ◆ 血液の病気（鎌状赤血球性貧血、多発性骨髄腫、白血病など）のある方
- ◆ 血が止まりにくいなど出血性の病気のある方、または消化性潰瘍のある方
- ◆ 他の勃起不全治療剤、勃起治療器具を使用している方、手術を受けたことのある方
- ◆ 高齢の方
- ◆ 心臓病、高血圧症、排尿障害などの治療薬を服用中の方*
- ◆ 過去に視力喪失の経験のある方

*タダラフィル錠 CI「FCI」には併用してはいけない薬や併用に注意すべき薬があります。ほかの薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師又は薬剤師に相談してください。

タダラフィル錠CI「FCI」の服用後に狭心症の発作が起きた時には

- ◆ 狭心症の発作が起きた場合は、その場で安静にし、直ちにかかりつけ医師に連絡してください。
- ◆ 今まで狭心症と診断されたことがない方でも、性行為中に狭心症の発作を起こすことがあります。
- ◆ 狭心症発作の治療には硝酸剤がよく使われますが、タダラフィル錠 CI「FCI」を服用中の場合は血圧を下げる効果が強く出ることがあります。その場合、発作治療のための硝酸剤が使用できず、他の薬剤を使用しなければならぬため、硝酸剤と同じ効果が得られないことがあります。
- ◆ 発作治療の際には、タダラフィル錠 CI「FCI」を「服用したこと」と「服用時間」を医師にお伝えください。
- ◆ 発作発生時には、ご自身がそのことを医師に伝えられない可能性もあります。そのため、あらかじめパートナーやご家族の方にタダラフィル錠 CI「FCI」を服用していることを伝え、本剤を服用していることが医師に伝わるようにしてください。

副作用症状が出たら服用を中止して医師にご相談ください

「気分が悪くなる」「頭痛」「めまい」「顔が赤くなる（ほてり）」「消化不良」「色が変わって見える」などの副作用が現れることがあります。自動車や機械の運転操作をする場合にはご注意ください。

なお、勃起の持続によってペニスが損傷し勃起機能を永続的に失うことがありますので、タダラフィル錠 CI「FCI」を服用後 4 時間以上勃起が続く場合は、すぐに医師に連絡してください。

その他の注意

- ◆ タダラフィル錠 CI「FCI」はあなたのために処方されたお薬です。ほかの人には絶対に譲らないでください。この薬は、人によっては薬の相互作用の問題で服用ができない場合があるお薬です。
- ◆ 他の薬との相互作用が出る場合があるので、ほかの医療機関を受診するときは、タダラフィル錠CI「FCI」を服用していることを申し出てください。
- ◆ タダラフィル錠 CI「FCI」には、エイズなどの性行為感染症を防ぐ効果はありません。
- ◆ 視覚や聴覚に異常を感じた方は、服用を中止して医師にご相談ください。
- ◆ タダラフィル錠 CI「FCI」は催淫剤や性欲増進剤ではありません。

次の薬剤を服用されている方はタダラフィル錠CI「FCI」を服用しないでください。

◆ 主なニトログリセリンなどの硝酸剤（飲み薬、舌下錠、貼り薬、吸入剤、スプレー）の商品名

（2021年2月現在）

アイトロール錠 10mg	ミニトロテープ 27mg
イソコロナール R カプセル 20mg	ミリステープ 5mg
イソビットテープ 40mg	メディトランステープ 27mg
シグマート錠 2.5mg/5mg	亜硝酸アミル「AFP」
ニコランジル錠 2.5mg/5mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド錠 10mg/20mg「サワイ」
ニコランジル錠 2.5mg/5mg「トーワ」	一硝酸イソソルビド錠 10mg/20mg「タイヨー」
ニコランジル錠 2.5mg/5mg「日医工」	一硝酸イソソルビド錠 10mg/20mg「トーワ」
ニトラステープ 40mg	一硝酸イソソルビド錠 10mg/20mg「日新」
ニトロール R カプセル 20mg	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」
ニトロールスプレー 1.25mg	硝酸イソソルビドテープ 40mg「サワイ」
ニトロール錠 5mg	硝酸イソソルビドテープ 40mg「テイコク」
ニトログリセリンテープ 27mg「トーワ」	硝酸イソソルビドテープ 40mg「モチダ」
ニトラダーム TTS25mg	硝酸イソソルビドテープ 40mg「東光」
ニトロベン舌下錠 0.3mg	硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg「S t」
ハイバジールコーワ錠 3/6	硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg「ZE」
バスレーターテープ 27mg	硝酸イソソルビド徐放錠 20mg「サワイ」
フランドルテープ 40mg	硝酸イソソルビド徐放錠 20mg「ツルハラ」
フランドル錠 20mg	硝酸イソソルビド徐放錠 20mg「トーワ」
ミオコールスプレー 0.3mg	

◆ sGC 刺激剤（リオシグアト）の商品名

アデムバス錠 0.5mg/1.0mg/2.5mg

医療機関名

担当医師

電話番号



富士化学工業株式会社
Fuji Chemical Industries Co., Ltd.

作成：2021年 6月